I. De Araneis & Scarabæis Philippensibus. Ex MSS. R. P. Geo. Jos. Camelli. Communicavit Jacobus Petiver, S. R. S.

De Araneis Crustaceis Philippensibus.

A Raneos fila deducere non ab intrinseco, tanquam excremento, ut ait Democritus & Plinius; sed extrinsecus de suo corpore, veluti cortice, assert cum Ari-

stotele Aldrovandus & Forerus.

Verum Anno 1695. (a) Araneos Crustaceos nitidissimè a GAZ. Nat. nigro & flavo picturatos, formæ Tribuli, vei potius Pa-Tab. 26. guri, in Horto domestico in Acacia & Fagara cæpi. Unde fig. 7. Democrili, Plinij, Josephi Blancani & aliorum sententia. Araneos ab intrinseco fila sua ducere vindicanda videtur. b GAZ. Nat. Alios testaceos (b) sexangulares dein Anno inveni subsequenti, stavo & nigro; alios (c) albo & nigro varia-Tab. 26. tos, & sex aculeis spinosos: Alium (d) item postea fig. 6. c GAZ. Nat. flavo & nigro variegatum, majorem, & formæ Lunaris. an Tab. 26. Hoitztocatl Niremberg: seu Araneus spinosus? morsu defig. 8. dGAZ. Nat, mentans, superiore & media corporis portione niger, Tab. 26. cætera luteus, formæ aculeatæ & sim lis Tribulo. Aranei fig. 5. erustacei ictui medetur Tambalquisay, Camaasa & Piligpoc. Nidum vel Ovarium texit electé sericeum, flavum vel

etiam virentem, in qua ova reponit candida.

1. Araneus Luzon. crustaceus, cornu lunulato. GAZ.

NATUR. Tab. 26. Fig. 7.

T

2. Araneus Luzon. testaceus, trilunatus. GAZOPHYL. NAT. Tab. 26. fig. 6.

3. Araneus Luzon. Bovinus. GAZ. NATUR. Tab. 26. fig. 5.

4. Araneus

4. Araneus Luzon. testaceus, angustus, trilunatus. GAZ. NAT. Tab. 26. sig. 8.

De Araneis alijs Luzonensibus.

5. Aranews Banayau I. Kamel. Aran. Luzon. mortiferus Smaragdino-aureus. GAZ. NAT. Tab. 29. fig. 4. Hic ictu soporem & mortem causat Hominibus & Brutis: gaudet Syringæ seu Sambach Arabum convolutis in solijs habitare: hujus ictui medetur decoctum Dauvæ & Ignis. an Araneus aureus, Lavalava Nirembergij, stuporem & insaniam inducens?

6. Araneus parvus brevipes, coloris chermesini, mortiferus. Banayau 2 Kamel.

7. Araneus gibbosus Luz. subsuscus, gibbo oblongo, per totum dorsum protracto, elevato & slavo Kamel. GAZ. NATUR. Tab. 29. sig. 12. Ova recondit in orbicularibus, slavis & sericeis nidis, candidula.

8. Araneus gibbosus alter. Corpore est Piso suppari, dorso proprie in altum gibbum elevato, de reliquo picturatus est aureo sulgente, argenteo relucente & nigro aterrimo.

9. Aranem longipes I. Kamel. Ar. Luz. longipes domeficus. GAZ NAT. Tab. 50. fig. I. Corpore est Muscæ
tenuiori, domesticus, retiarius, rete varium, quod præda
adveniente totum concutit. Communiter Mas & Fæmina
in eodem degunt. Famina habitior est, & una nocte
Ova exclusit, quæ mane in Piso pari racemulo congesta
ore pendentia gerebat; die 3 à capturâ pilosa aparuere,
4 magis pilosa, 5 frequentes aranei per vitrum dispersi
sunt, remanente inani & candido ovario ab ore matris
pendente.

10. Araneus longipes alter Kamel. Araneus Luzon. longipes, sem. Ricino æmulans. GAZ. NATUR. Tab. 50. sig. 4. Habitior est priore, ventre Piso pari splendido, & ut semen Ricini picturato, mucronato.

vi. Araneus longipes Luzon. 3. Domesticus est, hirsatus & innocuus. 4

5

6

7

8

9

IO

IL

(312)

12. Araneus longipes Trojanus sive 4. Bagua & Gambagamba Indis Tarantula Luzon. innocuus. GAZ. NAT. Tab 50. sig. 2. & A. Corporis mole Avellanam æquat, sericeum, albicans, folliculosum, globoso-subplanum ovarium ad ventrem gerens, ex quo mille prodeunt Araneorum. Cæterum suscus, domesticus, innocuus, vescens Proscarabæis. an Araneus 10 Hernandi?

13. Arancus longipes 5. Gagamba Luzonensibus. Cor-

pore minor, quod cinereo & nigro picturatum est.

14. Araneus longipes 6. Araneus Luzon. telarius, argenteo, flavo, & nigro transversim striatus. GAZ. NAT. Tab. 50. sig. 3. Subdialis est. Ejus sericeum album & planum ovarium, in quo ut puto 2000 ovorum alborum latebant. vid. Tab. 50. sig. B.

15. Araneus Luzon. oblongus, lutescens, longipes, ventre tenui, geniculo in caudam distincto. GAZ. NATUR,

Tab. 43. fig. 14.

13

15

x6

18

19

50

16. Araneus maximus, fuscus, pilosus; Damang Luzon. Corpore crastitudinis est pollicaris. Degit locis humidis:

perniciosus ut Vipera. an Species Tarantulæ?

17. Araneus Luzon. ex argenteo, flavo & susce pulchre mixto, pedibus nigris. GAZ. Nat. 29. sig. 6. Araneus pulchre picturatus: Caput, Pectus, corporis binæ striæ laterales, & illa per medium excurrens, argenteo relucente colore obducta: Binæ striæ inter argenteas excurrentes susce, 4 slavis transversim secantibus strijs cancellatæ: pedes longi, nigri.

18. Araneus Luzon. torosus, pilosus, totus suscus. GAZ.

NAT. Tab. 29. fig. 10.

19. Araneus Luzon. torofus, pilofus minor, dorso nigro

variegatus.

20. Araneus rarus, niger, splendens; forficulas habens ipso ventre compares; nec primo intuitu sacile dictu, quisnam venter, aut quæ sint forficulæ. GAZ. NATUR. Tab. 54. sig. 3.

degens, albo & griseo variegatus: Saltu Muscis insidians. Hispanis Cayman de las Moscas. GAZ. Nat. Tab. 54. 4.

21

| 22. Cotocoto. Araneus est Aquaticus. | 22 |
|---|--------------|
| 23. Laura vel Lavalava. Araneus est Domesticus. | 23 |
| De Scarabæis Luzonensibus. | - |
| Cantharis Luzon. Cetonia prasino-aurea, luteo-albican- tibus maculis variata, ad ventrem ejusdem coloris, sed Ta | I |
| tibus maculis variata, ad ventrem ejusdem coloris, sed T | the f |
| striatim picturata. GAZOPHYL. NAT. Tab. 26. fig. 9. | .D. 20. 1. y |
| Cantharis Luzon. pulcherrima, vagina integra non | 2 |
| fissâ, quinis aureo-cyaneis maculis ornatâ, ipsa Havo-au-G. | N. 37. 7 |
| rea; venter medius superne smaragdino-aureus & tribus | |
| aureo-cyaneis maculis notarus ut vagina dorsi: Inferior | |
| venter aureis & aureo-virentibus strjis transversim virga- | |
| tus est. | |
| Stockerus Luzon. viridis, scapulâ maculisq; purpureis. | |
| GAZ. NATUR. Tab. 37. fig. 7. | |
| Cantharis Luzon. minima, magnitudinis est hujatis | 3 |
| Cicindelæ, smaragdino-aurea, capite & pedibus cyaneis, | |
| collo luteo, corniculis plumatis. Indis Alibamban & | |
| Paranparan. | |
| Cantharis Catunduana & Bicolana major, palmo lon- | 4 |
| gior, auriluca, smaragdina. Indis Olaniban & Basan- | |
| goban. | |
| Cantharis oblonga communis, nitidissime tota, aureo- | 5 |
| viridis, Camarinensium. Diao, Giao, Laniban & Salibat G. | N. 48. 5 |
| Indis. GAZ. NAT. Tab. 48- fig 5. | |
| Cantharis cæruleo-aurea, elytris ad medium lutco-au- | . .7 |
| Total Milliania and American | N. 41. 2 |
| Cantharis merè viridis, Indis Ticpaclong. GAZ. NAT. | |
| Tab. 41. fig. 2. | |
| Cantharis auriluca, viridante & rubente striatim varia. | -8 |
| Cochinella Luzon. major, è cupreo viridique eleganter G. | N. 41. 3. |
| itriata. GAZ. NAT. Tab. 41. ng. 3. | |
| Cantharis Luzonio nona & maxima, perpolita, tota multo splendidior quinta, colore aureo-smaragdino per-G. | . 9. |
| multo iplendidior quinta, colore aurec-imiragamo per-G. | N. 28. 3. |

petuante

petuante. Differt a Quintâ, capite, quod longius; mustacis, qui curti & subplani; scapulari, quod longius angulose protensum, & pedibus, quorum ultima articulatio spinosa, uropygio, quod coloris est cuprei. Oculi nigri sunt.

Scarabaus pectinatus Luzon. aureo-smaragdinus. GAZ.

NAT. Tab. 28. fig. 3.

G. N. 37. 6. Tauri. Antennis articulatim nodosis; coloris in susceptibles of the control of the

Capricornus alter, atratus est & striatus. GAZ. NAT

G.N. 37.12. Tab. 37. fig. 12.

Capricornus Luzon. 3. Totus ex atro & pomi aurei co-

G. N. 28. 5 lore picturatus est. GAZ. NAT. Tab. 28. fig. 5.

G. N. 47. I. Tab. 47. fig. 1.

Buceros Naficornis I. Luzon. Hoang GAZ NAT. Tab. G. N. 49. 8. 49. fig. 8. & Kamel. in Append. Ray Hift. Plant. V. 3. p. 44.

Buceros Naficornis alter Bogang Luzon. GAZ. NAT.

G. N. 29. 2, Tab 29, fig. 2 & Kamel in App. Ray. p. 44.

Melolonthes seu Cantharis merè viridis major. Indis Salaguinto. Germanis Gruner, May-Koffer, & S. Joannis Koffer.

Melolonthes seu Cantharis merè viridis minor. Indis

G.N. 41. 2. Ticpaclong, Germ. Gold Koffer, id No. 7. G.N. 41. 2.

N. B. Inveniuntur & Flavæ, Rubeæ, Ceruleæ, & varie picturatæ.

Scarabæus arborens, seu Bruchus Majalis sublustris, in G.N. 38.11. susceptibles subjusted subjus

Scarabæus arboreus 2. luteo-fuscus, tenuissime striatus.

G. N. 38. 6, GAZ. NAT. Tab. 38. 6.

G. N. 38, 5, noste maculosus. G. N. Tab. 38, fig. 5.

Scarabæus atratus, elytris striatis, forcipulâ validâ 20 bifurcatâ, qua arbores atterebrat, donatus. G. N. Tab. 42. 3.

Scarabæus mirabilis, caput lato & denticulato scuto G. N. 42. 2 contegente. Gaudens Scilla. GAZ. NAT. Tab. 42. fig. 2.

Scarabæus pilularis torosus, niger, Luzonis minimus. Germ. Ross-Koffer. GAZ. NAT. Tab. 42. fig. 5.

Scarabæus Luz. elasticus, vaginis striatis. GAZ. NAT. 23
G.N. 27.10.

Tab. 27. fig. 10.

Scarabæus saltator Luz. Germ. Springer. Indis Dangdo. Hujas Europæo major est, sublustris, coloris terreo fusci. non ater ut ille; ad Pectus habet solidum kimulum, quo supine positus nititur in altum vibrari. Elytra striata. caput parvulum.

Scarabæus Saltator, seu ille parvus, oblongus, niger, qui supine positus e latere intenso in altum vibratur, in Luzone sordide niger est & sesquiuncialis. Hisp. Batecavezz. Germ. Springer & Schuester. Indis Baldoc bondoc.

Tagal Dangdo.

Scarabæus Saltator alter parvulus Europæo minor est,

luteus, & ad extremum niger.

Proscarabæus nocturnus domesticus Kameli.

26 Blatta domestica Luzon. nocturna. GAZ. NAT. Tab. G. N. 48. 9. 48. fig. 9. Cucca & Cuccaracha Hispan. Schioabem Germ. Luste. Barata. Ipis & Bangcocang Indis. hujus est Spe-

cies Gukiana.

Insectum est malè olens, elytris tenuibus, omnia depascens & arrodens. Mas coloris grisei, aliquibus nigris punctis variegatus. Famina tota coloris castanei, & minor mare, eva excludens oblongo-compressa ad latus Mas & Famina deposità senectà candidi sunt & tenelli. Utuntur Indi cinere poto in Astmate, contusis cum Saccharo, & impositis in Cancro & Panaritio & ulceribus suppurandis. Assos No. 6 vel 8. exhibent Puerie lumbricis laborantibus, quos enecant.

24.

25